



RumiLick

Ewe Booster

Proteïen, energie, spoormineraal aanvulling vir Herkouers
 Protein, energy, trace mineral supplement for Ruminants

V 24947

Voedingstof	Eenheid / Unit		Nutrient
Ru-Proteïen (Min)	240	g/kg	Crude Protein (Min)
Ureum (Maks)	35	g/kg	Urea (Max)
Proteïen vanaf NPN (Maks)	49.65	%	Protein from NPN (Max)
Vog (Maks)	120	g/kg	Moisture (Max)
Energie (Min)	9	MJME/kg	Energy (Min)
Kalsium(Maks)	20	g/kg	Calcium (Max)
Fosfaat (Min)	5	g/kg	Phosphorus (Min)
Magnesium (Min)	5	g/kg	Magnesium (Min)
Swael (Min)	3.5	g/kg	Sulphur (Min)
Vitamiene A	20 000	IU/kg	Vitamin A
Vitamiene D3	4 000	IU/kg	Vitamin D3
Vitamiene E	50	mg/kg	Vitamin E
Mangaan	125	mg/kg	Manganese
Koper	15	mg/kg	Copper
Kobalt	1	mg/kg	Cobalt
Yster	250	mg/kg	Iron
Jodium	5	mg/kg	Iodine
Sink	175	mg/kg	Zinc
Selenium	2	mg/kg	Selenium
Bevat groei bevorderaars en ionofore		Contains growth promoters and ionophores	
WAARSKUWINGS		WARNINGS	
Hierdie produk bevat medikamente en mag nie aan perde gevoer word nie. Lees die medikasie etiket vir meer besonderhede		This product contains medicaments and should not be fed to horses. Read the medication label for more information	
Hierdie produk bevat NPN bronne - lees die NPN waarskuwings voordat die produk gebruik word		This product contain NPN sources – read the NPN warnings before using the product	



PRODUK BESKRYWING			PRODUCT DESCRIPTION		
<p>Ooi Booster is 'n produksielek wat strategies aan ooie en oilammers gegee word, gedurende lamtyd, en voor dektyd om ooi kondisie en prestasie te verbeter. Dit voorsien die nodige voedingstowwe wat die ooi ondersteun met uier ontwikkeling, melkproduksie, en gesonde eiselvorming.</p>			<p>Ewe Booster is a production lick to be strategically supplemented to ewes and ewe lambs through lambing and before mating to increase body condition and performance. It supplies the necessary nutrients to assist the ewe with udder development, milk production and production of healthy egg-cells.</p>		
VOER INSTRUKSIES			FEEDING INSTRUCTIONS		
<p>Voer aan dragtige ooie vanaf ses weke voor tot ses weke na lamtyd. Voer aan droë ooie vanaf vier weke voor dektyd. Voer aan oilammers deur die droë seisoen.</p>			<p>Feed pregnant ewes from six weeks before, until six weeks after lambing. Feed dry ewes from four weeks before mating starts. Feed ewe lambs during the dry season.</p>		
AANBEVOLE INNAMES: (g/dier/dag)			RECOMMENDED INTAKE: (g/animal/day)		
Voor lam :		200g	Before lambing:		200g
Na lam:	Enkeling ooie	300g	After Lambing:	Single lamb ewes:	300g
	Meerling ooie;	350-400g		Multiple lamb ewes:	350 – 400g
Voor dektyd:		250 – 300g	Before mating:		250 – 300g
Ooilammers:		200g	Ewe Lambs:		200g