



RumiLick Production

Proteïn, energie, mineraal, spoormineraal aanvulling vir Herkouers
Protein, energy, mineral, trace mineral supplement for Ruminants

V 24935

Voedingstof	Eenheid / Unit		Nutrient
Ru-Proteïn (Min)	250	g/kg	Crude Protein (Min)
Ureum (Maks)	40	g/kg	Urea (Max)
Proteïn vanaf NPN (Maks)	45.9	%	Protein from NPN (Max)
Vog (Maks)	120	g/kg	Moisture (Max)
Energie (Min)	8.5	MJME/kg	Energy (Min)
Kalsium(Maks)	24	g/kg	Calcium (Max)
Fosfaat (Min)	6	g/kg	Phosphorus (Min)
Magnesium (Min)	5	g/kg	Magnesium (Min)
Swael (Min)	4	g/kg	Sulphur (Min)
Vitamiene A	20 000	IU/kg	Vitamin A
Mangaan	250	mg/kg	Manganese
Koper	75	mg/kg	Copper
Kobalt	1	mg/kg	Cobalt
Yster	250	mg/kg	Iron
Jodium	5	mg/kg	Iodine
Sink	300	mg/kg	Zinc
Selenium	1	mg/kg	Selenium
Bevat groei bevorderaars en ionofore		Contains growth promoters and ionophores	
WAARSKUWINGS		WARNINGS	
Hierdie produk bevat medikamente en mag nie aan perde gevoer word nie. Lees die medikasie etiket vir meer besonderhede		This product contains medicaments and should not be fed to horses. Read the medication label for more information	
Hierdie produk bevat NPN bronne - lees die NPN waarskuwings voordat die produk gebruik word		This product contain NPN sources – read the NPN warnings before using the products	



PRODUK BESKRYWING		PRODUCT DESCRIPTION	
<p>Rumilick Production is 'n proteïen, energie, mineraal, spoormineraal aanvulling vir skape en beeste. Dit word aanbeveel vir die laaste maande van die droë seisoen om diere kondisie te handhaaf, wanneer weidings hulle swakste voedingswaarde vertoon en baie laag in verteerbaarheid is. Die produk word ook aanbeveel vir jong groeiende diere regdeur die droë seisoen.</p>		<p>Rumilick Production is a protein, energy, mineral, trace mineral supplement for cattle and sheep. It is recommended for use during the latter part of the dry season, to maintain animal weight and condition, when the nutritional value and digestibility of grazing is at its lowest. This product should be used on young and growing animals throughout the dry season.</p>	
VOER INSTRUKSIES		FEEDING INSTRUCTIONS	
<p>Begin met produksielek wanneer die diere se kondisie punt tot onder 2,5 - 3 daal tydens die droë seisoen. Voorsien die lek so gereeld as moontlik, verkieslik daaglik. Sodra aanbevole innames gereeld oorskry word, kan dit 'n aanduiding wees dat weiding onvoldoende is, en dat addisionele ruvoer in die vorm van hooi bale beskikbaar gestel moet word.</p>		<p>Start with production lick as soon as the body condition score of animals falls beneath 2,5 – 3 during the dry season. Supply licks daily if possible. When the recommended intake is exceeded frequently, it could be an indication that the grazing is insufficient and that animals need to be supplied with additional roughage such as hay bales.</p>	
AANBEVOLE INNAMES: (g/dier/dag)		RECOMMENDED INTAKE: (g/animal/day)	
Skape:	200 – 300g/dag	Sheep:	200 - 300g/day
Beeste:	1000 – 1200g/dag	Cattle:	1000-1200g/day
Ooi lammers:	200g/dag	Ewe Lambs:	200g/day
Verse:	800g/dag	Heifers:	800g/day